

Keschmich ali noir

Vass8R05s146-150



INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp578

cl 8 R5 s146-150
Keschmich ali noir

Keschmich ali noir

8 R5 s. 146-150







DESIGNATION : Keschmich Ali noir

CLOS 8 PLANCHE RANG 5 Souche 146
150

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0.8.86

Date de Véraison :

29.7.86 X

Date de Maturité :

8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 1

s3 1

s4 2

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 5 Souche 146-150

Désignation : Keschmich ali noir

CHARGE :

Année :

Véraison :

1.8
29.8.88

Maturité :

Mill. : 0

Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

BAIE :

Année :

TG - G - M - P - Dim. : 22

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 5

s2 2

s3 2

s4 3

s5 2

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1986

Emplacement... 8 R 5... 1146 150... Désignation... Keschmich ali noir

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			24.3				
1	4	3 x					
2	4	3 x					
3	4	2 x					
4	4	0					
5	4	2 x					

1 le 24.3.86 -1

DESIGNATION : Keschmich ali noir

EMPLACEMENT : 8 R 5 1146 150

Date de la vendange : 16.9.86 (+4)

Poids de la vendange : 7,300 kg 608

Nombre de souches : 4 (608 g)

Nombre de grappes : 12

Pourriture : 0

Couleur : NRg x 0,6 (IC=0,173)

Indice réfract. : 18,2 (93)

Acidité du moût : 4,0

Date : 23.9

Pressurage

Densité : 1020

Date : 30.9

Mise en bouteille

Densité : 994

Degré alcoolique : 10°5

Acidité du vin : 3,5

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2,5
mg de couleur, fin

ANNEE 1987

NOM Keschnich ali noir EMBLACEMENT 8 R5 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	27.3	31.3	2								
2	5	23.3	27.3	8		3.6						
3	3	27.3	31.3	1		3.6						
4	6	27.3	31.3	4		1.6	3.6	9.6	3.8	6.8	10.8	14.9
5	4	27.3	31.3	1						+2		+4
22			29.3	16	+		3.6					
			+2				-4					
Port mi érigé Vigueur 2,5												

ANNEE 1988

NOM Keschnich ali n EMBLACEMENT 8 R5 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	25.3	5								
2	4	21.3	25.3	2								
3	4	25.3	28.3	2	6	27.5	31.5	3.6	1.8	4.8	8.8	29.8
4	5	21.3	25.3	3								
5	4	28.3	1.4	2								
		Pourriture :		0	Port :	mi érigé à couché		Vigueur :	3 moyenne	+2		+2
			25.3				31.5					
			+1				0					

ANNEE 1989

NOM Keschnich ali noir EMPLACEMENT 8 RSA 146.150

♀

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2	2							
2	4			1								
3	4			1	4,0	24,5	27,5	30,5	31,7	7,8	14,8	
4	4			2			0			+3		
5	4			3								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi' suge'

Vigueur : 35

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Keshmich ali noir

cl 8 R50. 146-150
(s. 146)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation : *Keschmich ali noir*
Emplacement : *cl 8 R 5 s - 146-150*
(s. 146)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Keschmich ali noir
clo 8 R 5 s. 146-150
(0.146)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Keschmich ali noir
dos 8 R 5 s - 146-150 (149)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *flex*

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ *tendance à* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 9. *hispid*

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre : Keschnich ali noir
Désignation : clos 8 R 5 s-146-150
Emplacement :

pas de grappe valable en 85

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 21).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Keschmich ali noir
8 R 50-146-150 (s. 150)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 15x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION : *Keschmich ali' noir*
EMPLACEMENT : *8 R5 146. 150 (0.149)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 ... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (5) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85/

N° d'ordre :

Désignation : *Keschmich ali noir*

Emplacement : *8R5 s. 146-150*

Angle des nervures : 1 - ② - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9

L₂/L : ⑩ - ⑪

Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20

Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉒ - ㉓ - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔

Sinus pétiolaire ouvert : ㉕

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉖ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉗ - ㉘

Fond sinus latéral Sup. en V : ㉙ - en U : 269 - autre : ㉚

Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛

Dents : forme : ㉜ - ㉝

Dents (angle) : 42 - ㉞ - 44

Angle du lobe terminal : 45 - ㉟ - ㊱

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50

Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㊳ - ㊴ - ㊵ - ㊶ - ㊷ - ㊸ - ㊹

Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊺ - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : ㊻ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües